


Información Técnica Ortesis Craneal



ORTHO-GALEA

Fabricado por ORTHOMEDICAL3D

Orthoprint3D, S.L.
Edificio UVainnova.
Parque Científico de la UVA - Campus Miguel Delibes
Paseo de Belén 11
47011 - Valladolid
ESPAÑA



Instrucciones para los padres o tutores:

El niño deberá llevar la ortesis 23 horas al día, aunque necesitará algunos días para habituarse a ella. El tratamiento finalizará cuando lo indique el especialista.

La ortesis deberá ponerse y quitarse durante la primera semana según la pauta descrita en la siguiente tabla:

Día	Puesto	Quitado	Total puesto	Total quitado	Siestas Dormir	Revisión de la piel
1	1 hora	1 hora	12 horas	12 horas	No	Cada vez que se quite la ortesis
2	2 horas	1 hora	16 horas	8 horas	No	Cada vez que se quite la ortesis
3	4 horas	1 hora	20 horas	4 horas	Si	Cada vez que se quite la ortesis
4	7 horas	1 hora	21 horas	3 horas	Si	Cada vez que se quite la ortesis
5	11 horas	1 hora	22 horas	2 horas	Si	Cada vez que se quite la ortesis
6	23 horas	1 hora	23 horas	1 hora	Si	Cada vez que se quite la ortesis

Se debe lavar tanto el casco como la espuma cuando estos estén sucios, si es posible diariamente, en el mismo tiempo de baño del bebé.

Se puede limpiar la espuma con alcohol y dejar secar al aire. Otra opción de limpieza: separar la espuma de la carcasa para limpiar con jabón neutro y agua fría. Frotar con un cepillo de uñas la carcasa plástica y con un paño o la mano, la espuma. En cuanto al secado, quitaremos el exceso de humedad con un paño limpio y dejaremos secar al aire.

No acercar nunca la ortesis craneal a una fuente de calor, se podría deformar la espuma.

Lave la cabeza del bebé con champú diariamente y no le coloque el casco craneal hasta que tanto la cabeza del niño como la ortesis estén secas.

Durante los primeros días el niño puede padecer sudoración excesiva hasta habituarse al casco, en caso de que ocurra se puede retirar la ortesis para secar la cabeza del bebé.

Si apareciese erupción cutánea en la base del cráneo, consulte a su médico.

Avisé a su técnico ortopédico si hay alguna zona irritada y esta no se elimina tras una hora sin la ortesis puesta o mediante el uso de vaselina no granulada en la zona, puede ser necesario realizar algún ajuste en la ortesis.

Retire la ortesis si el niño padece fiebre elevada, gripe o similar, así como durante el baño.

La ortesis craneal es una ortesis dinámica que requiere de readaptaciones a los posibles cambios que se produzcan en la superficie craneal.